

關於性傳染病的 25 點事實



25 STD FACTS Thomas Lickona

譯者：許雅雯

1. 每八秒鐘就有一位青少年罹患性傳染病。
2. 大約有九百萬的青年人，是每年都會被診斷出患上一種新的性傳染病。
3. 未婚且已有性行為的青年人，據估計約有 50% 的人會在 25 歲前染上性病。只有一般感冒是比性傳染病更普遍的疾病。
4. 在七〇年代中期以前，只有兩種主要的性病：梅毒及淋病。現在則已經已有超過廿五種常見的性傳染病。
5. 十二歲以上的人當中，有 1/6 的人感染過皰疹。
6. 美國在所有工業化國家當中，擁有最高的罹患性病比率。
7. 當你罹患性病時，大部分時候是不會有明顯的症狀的。
8. 根據 Gutmacher 中心的研究顯示，保險套的使用率在青少年族群中成長最多，但同時青少年罹患性病的比率也增加。
9. 最常見的性病是人類乳突病毒—每年有 550 萬的病例。
10. 未經治療的人類乳突病毒可能會導致子宮頸癌，每年將近有 5000 名婦女死於子宮頸癌—遠超過因愛滋病死亡的人數。
11. 婚前沒有性行為的女孩不會得到子宮頸癌。
12. 據估計大約有 45 至 60 萬的美國人患有生殖器官皰疹。
13. 細菌性的性傳染病是可以被治療且痊癒的，雖然可能會有些不可逆的後果（例如不孕）。病毒性的性傳染病，如愛滋病及皰疹，是無法治癒的。
14. 因性病而造成的健康問題，女孩身上發生的比率及嚴重程度是遠超過男孩的。
15. 女孩年紀越小，越容易受到披衣菌感染，披衣菌則是造成盆腔炎發炎的主因。
16. 第一次的盆腔炎發炎有 25% 的機率造成不孕，第二次的感染為 50% 的機率，第三次的感染則變成 75% 得機率造成不孕。
17. 大部分的性傳染病都會在懷孕或生產過程中，由母體傳染給胎兒。
18. 大部分的性傳染病是可以透過口交傳遞的。
19. 醫生指出口腔皰疹在青少年族群中有顯著的增加。
20. 有性行為的未婚男女當中，有 1/5 的人患有生殖器官皰疹，而此類疾病是無法被根治的。
21. 已經患有一種性病的人，同時罹患另外一種性傳染病的風險也比較高。
22. 服用避孕藥可能會增加女孩同時感染數種性病的機率。
23. 某項研究指出，有 3/4 已知自己患有性病的男性表示，在發生性行為前他們並不會告知對方自己有性病的狀況。
24. 衛生署在 2001 年提出的報告指出，保險套對於八大性傳染病當中的六個是完全沒有防護能力。近期的研究指出保險套對於人類乳突病毒及披衣菌僅有些微的防護效果。
25. 性病通常會在婚姻之外的性行為間傳遞，是因為未婚的性伴侶並不清楚對方可能帶有什麼樣的疾病。

—湯馬士·李寇納 (Thomas Lickona)
尊重和責任研究中心
www.cortland.edu/character
同時可上網站 www.medinstitute.org